## インフルエンザHAワクチン予防接種 予診票 [#意接種用]

※太い線で囲まれたとる ※お子さんの場合は、健				- さい。 [ ii	診察前の体温		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	分
住 所					( )	_		
(フリガナ) 予防接種を受ける人の氏名			男・女		明治・大正		;	
			3 2	生年月日		年	月	日生
(保護者の氏名) 						(	満歳	ヵ月)
質 問 事 項						回答欄		
1. 今日受けられる予防		( <b>()</b>	いいえ					
2. 今日、普段と違って	ある(具 	:体的に)	ない					
3. 現在、何かの病気で医師にかかっていますか						(病名)	いいえ	
4. 最近1ヵ月以内に何か病気にかかりましたか						はい(病名)		
5. 今までに特別な病気(先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、血液疾患、脳神経、免疫不全症、 悪性腫瘍、その他の病気)にかかり、医師の診断を受けたことがありますか						ある(具体的に)		
["ある"の場合]その病気	を診てもらってい	る医師に、今日の予防接種を受	けて良いとい	われましたか	はい		いいえ	
6. 今までにひきつけ(けいれん)を起こしたことがありますか						ごろ 回くらい は 年 月ごろ	ない	
["ある"の場合]ひき	はい (	°C)	いいえ					
7. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか						年 月ごろ 中・治療していない	ない	
8. 【予防接種を受けられる方がお子さんの場合】 分娩時、出生時、乳幼児健診などで異常がありましたか						:体的に)	ない	
9.【ご婦人の方に】現る	生、妊娠してい	ますか			は	; <b>し</b> \	いいえ	
10. インフルエンザの	予防接種を受け	けたことがありますか			ある(	年 月ごろ)	ない	
["ある"の場合]その	D際に具合が悪	くなったことはありますた	),		あ	る	ない	
インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか						防接種名)	ない	
11. 4週間以内に予防接種を受けましたか						防接種名)	ない	
12. 薬や食品(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹や蕁麻疹が出たり、体の具合が悪くなったことがありますか						、食品名)	ない	
13. 近親者の中に予防接種を受けて、具合が悪くなった方はいますか						いる(予防接種名)		
14. 近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか						る	いない	
15. 1ヵ月以内に家族や周		る	いない					
16. その他、健康状態の	Dことで医師に	伝えておきたいことがあ	れば具体的	のにご記入く	ください(投薬物	犬況など)		
			⋸師記入欄					
		種は(実施できる・見合わせ 構法に基づく救済について説		)と判断しま 医師の署名 または記名		本人(またはその 廣樹 (果)	保護者)に対し	
		本人(またに	<b>はその保</b> 筆					
医師の診察・説明を受け、	 予防接種の効!	果や副反応などについて理			 に同意し、接種を	 *希望しますか.		いいえ
署名	. 3 1/3 32 12 9 7/33		代筆者の場		<sub>\</sub> /なお、	被接種者が自署 ん被接種者との紹	できない場合	は代筆者が
			<b>E</b> 師記入欄					
使用ワ	7クチン名・メ-	ーカー名		接種量	<u> </u>	ミ施場所・医師	で 名・接種年	月日
インフルエンザHAワクチン □「ビケンHA」 □フルービックHA □フルービックHAシリンジ □ □ 0.25mL 製造販売: (一財) 阪大微生物病研究会 □ (6ヵ月以上3歳								
(販売:MSD株		カルテNo.		<b>□0.5mL</b> (3	3歳以上) 接種年	月日: 平成	年 月	日 時

# インフルエンザHAワクチンを接種される方へ

インフルエンザHAワクチンの予防接種を実施するにあたって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、以下のインフルエンザHAワクチンに関する情報を必ずお読みください。また、予診票には出来るだけ詳しくご記入ください。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入ください。

### ● ワクチンの効果と副反応

予防接種により、インフルエンザの感染予防や症状を軽くし、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。ワクチン接種に伴う副反応として、注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水疱などがみられることがあります。また発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐・嘔気、下痢、関節痛、筋肉痛、筋力低下なども起こることがあります。過敏症として、発疹、蕁麻疹、湿疹、紅斑、かゆみなども起こることがあります。その他に蜂巣炎、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神、血管迷走神経反応、ぶどう膜炎があらわれることがあります。強い卵アレルギーのある方は強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出てください。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)脳炎・脳症、脊髄炎、視神経炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(5)けいれん(熱性けいれんを含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎など)、(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、(12)ネフローゼ症候群、このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出てください。

#### ● 予防接種を受けることができない人

- 1. 明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)
- 2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- 3. 過去にインフルエンザHAワクチンの接種を受けて、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難、全身性の蕁麻疹などを伴う重症のアレルギー反応)を起こしたことがある人なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いでください。
- 4. その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

#### ● 予防接種を受ける際に、医師の相談が必要な人

- 1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
- 2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
- 3. 過去に予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、蕁麻疹などのアレルギーを疑う異常がみられた人
- 4. 今までにけいれんを起こしたことがある人
- 5. 過去に本人や近親者で免疫状態の異常を指摘されたことのある人
- 6. 間質性肺炎や気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- 7. 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 8. 妊娠の可能性のある人

#### ● ワクチン接種後の注意

- 1. インフルエンザHAワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応(息苦しさ、蕁麻疹、咳など)が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- 3. 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 4. 万一、高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

接種予	月	日( )	医療機関名	 なかの外科クリニック
定日	時	分頃	関名	1013 00/11147 J <b>ニ</b> フ フ

インフルエンザHAワクチンの接種により、健康被害(入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、救済手続きを行う制度があります。 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ先は右記のとおりです。